



Indikationen

Kopf- und Halsbereich

Anwendung bei

- Postoperativem, akutem Lymphödem (Zahnextraktion, Lidkorrektur)
- Migräne / Kopfschmerzen
- Zustand nach grippalen Infekten
- Chronischem Schleimhautkatarrh (Sinusitis)
- HWS-Syndrom (Schleudertrauma)
- Hämatomen
- Tinnitus

Brust- und Rückenbereich

Anwendung bei

- Lymphödem (Mamma-Ca)
- BWS-Syndrom
- LSW-Syndrom (Discushernie)
- Lumbalgien
- Ischialgien
- Posttraumatischen Ödemen (Rippenfraktur)
- Postoperativen Ödemen
- Hämatomen

Arm- und Brustwandbereich

Anwendung bei

- primärem und sekundärem Arm- und Brustwandlymphödem
- Lipödem
- Sudeck'scher Dystrophie (Gips, psychosomatische Einflüsse)
- Hämatomen
- Ödemen nach Operationen (u.a. Liposuction)

Beinbereich

Anwendung bei

- primärem und sekundärem Beinlymphödem
- Lipödem
- postoperativem Ödem (Liposuction)
- Hüftarthrose
- Kniearthrose
- Sudeck'scher Dystrophie (Gips, psychosomatische Einflüsse)
- Ödemen nach Unfällen
- Hämatomen